

Aspects prothétiques de la réhabilitation implanto-portée de la canine maxillaire

J. PERRIN, L. COSTAIN, N. LAFERTÉ,
E. PORN, G. BREZAUER, H. PLARD

INTRODUCTION. La canine maxillaire est une dent peu couramment implantée, le risque associé au placement d'implants étant élevé. Le placement de deux implants et un support en titane conventionnel facilite néanmoins cette intervention. Les auteurs décrivent les techniques de fixation et l'implantation de cette dentition, les difficultés qui peuvent survenir et proposent des précautions pour éviter ces complications dans cette dent.

MOTS CLÉS. canine • prothèse • implants • maxillaire • dentition de repos • denture • denture partielle • orthodontie

CONTRIBUTION DES AUTEURS.
Conception générale de l'article : J. Perrin et H. Plard ; rédaction : J. Perrin et H. Plard ; révision : J. Perrin, H. Plard et G. Brezauer ; édition en ligne : J. Perrin et H. Plard.

DISCUSSIONS.
Les auteurs discutent toutes leurs techniques et commentaires.

La perte en charge de l'absence sur accolade d'une ou des deux canines maxillaires nécessite une situation clinique spécifique : absence maxillaire et une dent partielement importante dans sa place fonctionnelle (orthodontie). Elle a pour rôle prépondérant dans l'absorption de cette dent par l'ensemble de la dentition lors des mouvements en latéralité de la mandibule. Au niveau orthodontique, elle assure l'équilibre entre les dentitions et les deux postérieures, les postérieures, et forme de ce résultat sont particulièrement importants dans l'orthodontie de repos.

Au cours de la croissance, il peut arriver également de voir les deux canines maxillaires complètement absentes. Ces deux cas peuvent nécessiter un travail de reconstruction précoce. Si l'äge adulte, en cas d'absence de cette dent, la recherche d'un autre type d'implant et d'une couronne fixe associée est une alternative thérapeutique de choix, de par les risques, la nécessité et l'importance de cette dentition. Ils mettent en œuvre également quelques précautions prédictives pour éviter des complications dans cet article, afin d'assurer une bonne intégration biomimétique, esthétique et fonctionnelle de cette dent.

CANINE MAXILLAIRE ET ORTHODONTIE

1. Résumé de la canine maxillaire sur l'os de repos adulte et plusieurs délogages. Les plus fréquentes sont l'absorption dentaire, l'ostéolyse dentaire et l'implantation (fig. 1a-1c).