



Exemple clinique d'avulsion-implantation-temporisation immédiate dans le secteur antérieur

■ J. Perrin / N. Labrid ■



Pour les patients, la perte d'un ou de plusieurs dents, notamment dans le secteur antérieur, est toujours une épreuve psychologique, fonctionnelle et esthétique difficile à accepter.

Parmi les solutions de remplacement, la mise en place d'implants est celle qui se rapproche le plus de la situation naturelle, en respectant au maximum les dents adjacentes.

Depuis quelques années, les techniques implantaires ont évolué pour répondre au plus vite aux attentes des patients devant subir une ou plusieurs avulsions.

Aux degrés inférieurs de l'abîme (dent, notamment, la mise en charge d'un ou de plusieurs mois et le recouvre-

ment des implants par la muqueuse après sa mise en place [1], une possibilité thérapeutique s'est progressivement développée : l'avulsion-implantation-temporisation immédiate. Cela consiste à mettre en place un implant dans l'alvéole post-extractionnelle et d'y faire une prothèse non fonctionnelle dans les 48 heures [2-4].

Avantages (et inconvénients) de la temporisation immédiate dans le secteur antérieur

Psychologiquement pour le patient, tout est dit dès la seule intervention chirurgicale précoce, mais en